

بررسی زیر واحدها و بخش های مختلف پروتئین کنجاله بادام در مقایسه با کنجاله های سویا و پنبه دانه با

استفاده از روش های الکتروفورز SDS-PAGE و CNCPS

امین خضری^{1*}، محسن یوسفی انصاری²، محمدرضا محمدآبادی³

¹ استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

² دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

³ دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ دریافت: 1390/07/20، تاریخ پذیرش: 1390/12/24

چکیده

در این پژوهش به منظور مطالعه زیر واحدها و بخش های مختلف پروتئین کنجاله بادام و مقایسه آن با کنجاله های سویا و پنبه دانه از دو روش الکتروفورز SDS-PAGE و روش CNCPS استفاده شد. نتایج بخش های مختلف پروتئین بر اساس روش CNCPS در این پژوهش نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین های نیتروژن غیرپروتئینی (بخش A)، پروتئین حقیقی محلول (بخش B₁)، پروتئین با قابلیت هضم سریع در شکمبه (بخش B₂)، پروتئین با قابلیت هضم کند در شکمبه (بخش B₃) و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (بخش C) برای کنجاله بادام در مقایسه با کنجاله های سویا و تخم پنبه است ($p < 0/05$). در روش SDS-Page دو پلی پپتید اصلی اسیدی با دامنه وزن مولکولی 63 تا 100 کیلودالتون و پلی پپتید بازی با دامنه وزن مولکولی 20 تا 35 کیلودالتون برای پروتئین آمادین بادام مشاهده گردید. همچنین دو نوع پروتئین عمده در کنجاله سویا شامل گلیسینین و بتاکنگلیسینین مشاهده شد. گلیسینین دارای دو زیرواحد اسیدی (عمدتا دارای اسیدهای آمینه اسیدی) و بازی (دارای اسیدهای آمینه بازی) به ترتیب با وزن مولکولی 40 و 21/30 کیلودالتون و پروتئین بتاکنگلیسینین دارای سه زیرواحد α ، β و α با وزن مولکولی به ترتیب 91/83، 80/49 و 47/16 بود. در پژوهش حاضر، الگوی زیرواحدهای پروتئینی در کنجاله پنبه دانه نشان دهنده 4 زنجیره پلی پپتیدی بوده که مربوط به پروتئین های گلوبولین 9S با دو زیر واحد به وزن مولکولی 78/36 کیلودالتون و 71/10 کیلودالتون، گلوبولین 5S با یک زیر واحد به وزن مولکولی 25/47 کیلودالتون و آلبومین 2S با یک زیر واحد به وزن مولکولی 15/84 کیلودالتون می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کنجاله بادام با توجه زیر واحدها و بخش های مختلف پروتئین دارای ارزش تغذیه ای مناسب برای جایگزینی با کنجاله سویا در تغذیه دام می باشد.

کلمات کلیدی: کنجاله بادام، زیرواحدهای پروتئینی، الکتروفورز SDS-Page، CNCPS.

خوراکی و نوع ساختمان پروتئین از جمله این عوامل می باشند (Stern et al., 1997). در سیستم های جدید تنظیم جیره نشخوارکنندگان فراسنجه های پیچیده ای برای تخمین سنتز پروتئین و تجزیه آن در شکمبه، وارد محاسبات و مدل های ریاضی شده است (Tamminga et al., 1994). در حقیقت بکارگیری موفقیت آمیز این سیستم ها به منظور تعادل بین سنتز پروتئین میکروبی و پروتئین عبوری از شکمبه و در نتیجه کاهش دفع نیتروژن از بدن حیوان، مستلزم افزایش اطلاعات از خصوصیات پروتئین ها در این مواد خوراکی می باشد. بنابراین، هدف این آزمایش، مطالعه زیر واحدها و بخش های مختلف پروتئین کنجاله بادام در مقایسه با کنجاله های سویا و پنبه دانه با استفاده از روش های الکتروفورز SDS-PAGE و CNCPS به منظور آگاهی کامل تر از کیتیک هضم و تجزیه پذیری این منابع پروتئینی در دام بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه از کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه روغن کشی شده به روش حلال استفاده شد. پروتئین خام نمونه خشک شده کنجاله ها پس از آسیاب کردن با آسیاب دارای الک با قطر منافذ 1 میلی متر، بر اساس روش AOAC (2000) اندازه گیری شد. مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بر اساس روش Van soest et al. (1991)، بدون استفاده از

در سال های اخیر با افزایش نیاز به مواد خوراکی و در نتیجه افزایش تولیدات دامی، قیمت مواد خوراکی دامی، به ویژه مواد خوراکی پروتئینی نیز بالا رفته است. بنابراین، استفاده از مواد خوراکی جایگزین و ارزان، به ویژه فرآورده های جانبی حاصل از محصولات کشاورزی در تغذیه دام اهمیت بسیار زیادی دارد. فرآورده های جانبی حاصل از محصولات کشاورزی دارای مواد آلی بالایی بوده که عمدتاً مورد استفاده قرار نگرفته و به دلیل دفع در محیط زیست، باعث آلودگی آن می گردند. بادام با نام علمی *Prunus dulcis* از دسته گیاهان گل دار و بومی نواحی خاورمیانه و جنوب آسیا بوده که بر اساس آمارهای سازمان خواربار جهانی (FAO, 2009)، ایران چهارمین کشور تولید کننده بادام در جهان می باشد. کنجاله بادام محصول جانبی حاصل از روغن کشی میوه بادام بوده که در طی سال های اخیر تولید این فرآورده های جانبی در کشور افزایش یافته است. بر اساس مطالعات ابتدایی انجام گرفته توسط نگارنده (داده های گزارش نشده) کنجاله بادام به دلیل مقدار پروتئین بالا، می تواند منبع پروتئینی مناسبی برای جایگزینی با دیگر منابع خوراکی پروتئینی از جمله کنجاله سویا در تغذیه دام باشد. عوامل متعددی تجزیه پذیری پروتئین مواد خوراکی در شکمبه و نگاری دام های نشخوارکننده را تحت تأثیر قرار داده که مقدار و نوع زیرواحدهای پروتئین های مواد

که حاوی پروتئین دناتوره بود به لوله های اپندرف منتقل و تا زمان انجام الکتروفورز در دمای 20 - درجه سانتیگراد نگهداری شد.

الکتروفورز پروتئین ها با استفاده از تکنیک SDS-Page، به روش Laemmli (1970) انجام شد. مقدار 25 میکرولیتر از پروتئین استخراج شده که تقریباً "حاوی 50 میکروگرم پروتئین بود، به چاهک های الکتروفورز با ژل بالایی حاوی 3/75 درصد آکریلامید-بیس آکریلامید و ژل پایینی حاوی 12 درصد آکریلامید-بیس آکریلامید منتقل شد. ابعاد ژل $140 \times 110 \times 1$ میلی متر و زمان الکتروفورز 3 ساعت (تا رسیدن رنگ بروموفنل بلو به لبه پائینی ژل) و شدت جریان 30 میلی آمپر در دستگاه PROTEIN II xi SLABGEL (شرکت BIO-RAD) بود. پس از بیرون آوردن ژل از شیشه های الکتروفورز با محلول حاوی 0/0625 گرم رنگ کماسی بریلینت بلو، 7 درصد اسید استیک خالص و 20 درصد متانول به مدت 12 ساعت رنگ آمیزی و سپس با محلول حاوی 7 درصد اسید استیک خالص و 5 درصد متانول به مدت 12 ساعت رنگبری شد. از مارکر پروتئینی BIO-RAD برای تعیین وزن مولکولی زیرواحدهای کنجاله های مورد آزمایش استفاده شد. حرکت نسبی هر مارکر پروتئینی در ژل محاسبه و در مقابل لگاریتم وزن مولکولی آن خط استاندارد رسم شد. با قرار دادن حرکت نسبی هر زیرواحد پروتئین کنجاله های بادام، سویا، و پنبه دانه لگاریتم وزن مولکولی آن زیرواحد و با آنتی

سولفیت سدیم، استون و آنزیم آلفا آمیلاز تعیین گردید. برای تعیین بخش های نیتروژنی در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) از روش Licitra et al. (1996) استفاده گردید. برای تعیین نیتروژن غیرپروتئینی (A) از تنگستات سدیم استفاده شد. همچنین نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی¹ و شوینده خنثی² در ادامه اندازه گیری بخش الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با روش Van soest et al. (1991)، اندازه گیری شد. به منظور جلوگیری از اختلال در استخراج پروتئین و انجام الکتروفورز، روغن باقیمانده در کنجاله، با استفاده از اتر پترولیوم به طور کامل حذف شد. برای استخراج پروتئین جهت انجام الکتروفورز مقداری از کنجاله ها (دارای 1 میلی گرم نیتروژن) به درون لوله های اپندرف منتقل شد. مقدار 750 میکرولیتر بافر استخراج نمونه SDS-Page حاوی 0/625 مولار تریس - اسیدکلریدریک (pH=6/8)، 10 درصد سدیم دودوسیل سولفات، 2/5 درصد بتامرکاپتواتانول، 7 درصد گلیسرول و 4 میلی گرم بروموفنل بلو اضافه شد. پس از 30 دقیقه هم زدن روی هم زن مخصوص لوله اپندرف در دمای 4 درجه سانتیگراد، پروتئین نمونه ها استخراج و پس از قرار دادن در آب 95 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه و سانتریفوژ با سرعت $10000 \times g$ به مدت 1 دقیقه، مایع صاف شده فوقانی جدا گردید. مایع فوقانی،

¹-Acid detergent insoluble nitrogen (ADIN)

²-Neutral detergent insoluble nitrogen (NDIN)

مقادیر اندازه گیری شده پروتئین حقیقی محلول (بخش B₁) در کنجاله‌های بادام، سویا و پنبه دانه به ترتیب 15/56، 17/21 و 17/64 درصد از پروتئین خام بود (جدول 1). اختلاف معنی دار بین میانگین‌های کنجاله بادام با دو کنجاله دیگر وجود داشت. این بخش در کنجاله بادام کمترین و در کنجاله پنبه دانه بیشترین بود ($p < 0/05$). نتایج پژوهش حاضر با مقادیر گزارش شده توسط دیگر محققین (Ghoorchi & Arbabi, 2010; MirzaiiAlomati *et al.*, 2005) همخوانی داشت ولی با مقادیر Chalupa and Sinffen (1996) همخوانی نداشت. بخشی از اختلاف بین گزارش‌های مختلف احتمالاً مربوط به استفاده از بافرهای مختلف می‌باشد (Krishnamoorthy *et al.*, 1982). همچنین بخش عمده‌ای از پروتئین کنجاله پنبه دانه را گلوبولین‌ها و آلبومین‌ها تشکیل داده که تحت تاثیر حرارت تغییر می‌کنند (Arieli, 1998).

پروتئین با قابلیت هضم سریع در شکمبه (بخش B₂)، در حقیقت ترکیبات نیتروژن‌دار محلول در شوینده خنثی است که بخشی از آن در شکمبه تجزیه شده و بخشی نیز وارد روده می‌شود، عبور این بخش از شکمبه به نرخ نسبی هضم و عبور بستگی دارد. مقدار B₂ در کنجاله‌های بادام، سویا و پنبه دانه به ترتیب 66/55، 63/43 و 39/29 درصد از پروتئین خام بود (جدول 1).

لگاریتم وزن مولکولی زیر واحد تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS (2000) مقایسه میانگین‌ها در سطح آماری $p < 0/05$ انجام گرفت.

نتایج و بحث

بخش‌های مختلف نیتروژن دار کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه

نتایج بخش‌های مختلف نیتروژن بر اساس روش CNCPS در کنجاله‌های بادام، سویا و پنبه دانه در جدول 1 نشان داده شده است. مقدار نیتروژن غیرپروتئینی (بخش A) در کنجاله‌های بادام، سویا و پنبه دانه به ترتیب 6/68، 5/59 و 15/45 درصد از پروتئین خام بود (جدول 1). بیشترین میزان بخش A مربوط به کنجاله پنبه دانه و کمترین آن مربوط به کنجاله سویا بود ($p < 0/05$) که با مقادیر گزارش شده توسط MirzaiiAlamoti *et al.* (2005) و Ghoorchi and Arbabi (2010) همخوانی داشت، اما در مقایسه با نتایج Sniffen *et al.* (1992) و Chalupa and Sinffen (1996) متفاوت بود که احتمالاً به دلیل روش مورد استفاده برای اندازه گیری نیتروژن غیرپروتئینی، روش برداشت و خشک کردن و انبار کردن مواد خوراکی و همچنین نوع رسوب دهنده‌های پروتئینی در آزمایش‌های مختلف است.

جدول 1- بخش های مختلف نیتروژن در کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه بر اساس روش CNCPS (بر اساس درصد ماده خشک).

Table 1- Different nitrogen fractions in almond, soybean and cottonseed meals according to CNCPS method (DM basis).

SEM	کنجاله			ترکیب شیمیایی Chemical composition
	پنبه دانه Cottonseed	سویا Soybean	بادام Almond	
0.39	28.1 ^c	48.5 ^b	51.87 ^a	پروتئین خام Crude protein
0.42	15.45 ^a	5.59 ^c	6.68 ^b	بخش A درصد از پروتئین خام Fraction A (% of CP)
0.31	17.64 ^a	17.21 ^b	15.56 ^c	بخش B ₁ درصد از پروتئین خام Fraction B ₁ (% of CP)
0.47	39.29 ^c	63.43 ^b	66.55 ^a	بخش B ₂ درصد از پروتئین خام Fraction B ₂ (% of CP)
0.22	3.06 ^b	9.08 ^a	3.15 ^b	بخش B ₃ درصد از پروتئین خام Fraction B ₃ (% of CP)
0.16	24.56 ^a	4.70 ^c	8.06 ^b	بخش C درصد از پروتئین خام Fraction C (% of CP)

حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده تفاوت بین میانگین ها می باشد ($p < 0/05$). A: نیتروژن غیر پروتئینی، B₁: پروتئین حقیقی سریع تجزیه در شکمبه، B₂: پروتئین حقیقی متوسط تجزیه، B₃: پروتئین حقیقی کند تجزیه، C: پروتئین غیر قابل دسترس.

اشتباه های ناشی از اندازه گیری در این بخش جمع شده که احتمالاً یکی از دلایل اختلاف مقادیر گزارش شده توسط محققین مختلف می باشد. حرارت دادن مواد خوراکی پروتئین های B₂ را تخریب کرده و آن ها را نامحلول می سازد که در این شرایط بخش های B₃ و C افزایش می یابد (Arieli, 1998).

پروتئین با قابلیت هضم کند در شکمبه (بخش B₃) برای کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه

در واقع بیشترین بخش B₂ مربوط به کنجاله بادام و کمترین مربوط به کنجاله پنبه دانه بود (MirzaiiAlamoti *et al.* (2005) $p < 0/05$) مقدار پروتئین با قابلیت هضم سریع در شکمبه را برای کنجاله پنبه دانه 40 درصد و کنجاله سویا 72/7 درصد و Ghoorchi & Arbabi (2010) برای کنجاله تخم پنبه دانه 12/29 و کنجاله سویا 4/09 درصد از پروتئین خام گزارش کردند. چون این بخش از طریق اختلاف محاسبه شده، لذا تمامی

بسیار قوی با نیتروژن غیرقابل هضم شکمبه ای مواد خوراکی داشته و لذا درجه حرارت مناسب و کنترل شده طی فرآیندهای حرارتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

وزن مولکولی زیر واحدهای پروتئینی

نتایج حاصل از الکتروفورز SDS-Page زیر واحدهای پروتئینی کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه در شکل 1 نشان داده شده است. پروتئین های بادام شامل آلومین، گلوبولین (آماندین) و اولئوسین بوده که آماندین پروتئین اصلی ذخیره ای در بادام است. این پروتئین در آب محلول بوده و 70 درصد کل پروتئین های محلول بادام را تشکیل می دهد. بر اساس شکل 1 در پژوهش حاضر، پروتئین آماندین از دو پلی پپتید اصلی اسیدی با دامنه وزن مولکولی 63 تا 100 کیلودالتون و پلی پپتید بازی با دامنه وزن مولکولی 20 تا 35 کیلودالتون تشکیل شده است. همچنین در این مطالعه دو نوع پروتئین عمده در کنجاله سویا شامل گلیسینین و بتاکنگلیسینین مشاهده شد. گلیسینین دارای دو زیرواحد اسیدی (عمدتا دارای اسیدهای آمینه اسیدی) و بازی (دارای اسیدهای آمینه بازی) به ترتیب با وزن مولکولی 40 و 21/30 کیلودالتون بود. پروتئین بتاکنگلیسینین دارای سه زیرواحد α ، α و β با وزن مولکولی به ترتیب 91/83، 80/49 و 47/16 بود. این پروتئین بسته به نوع واریته و شرایط تغذیه ای گیاه سویا، زیرواحدهای متفاوتی دارد.

به ترتیب 3/152، 9/079 و 3/06 درصد از پروتئین خام بود (جدول 1). در پژوهش حاضر بیشترین میزان بخش B₃ برای کنجاله سویا برآورد شد که حدود سه برابر بیشتر از بخش B₃ در کنجاله های بادام و پنبه دانه بود ($p < 0/05$). در پژوهشی MirzaiiAlamoti *et al* (2005) مقدار پروتئین با قابلیت هضم کند در شکمبه را برای کنجاله پنبه دانه 10 درصد و کنجاله سویا 0/8 درصد و Shannak (2000) برای کنجاله سویا 1 درصد از پروتئین خام را به صورت بخش B₃ گزارش کردند. بخش B₃ پروتئین در اکثر مواد خوراکی بویژه پروتئین های گیاهی بسیار کم می باشد. این پروتئین ها به دیواره سلولی متصل شده و در شوینده خنثی نامحلول می باشند.

بخش C پروتئین، که در سیستم CNCPS غیرقابل تجزیه در شکمبه فرض می شود در کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه به ترتیب 8/058، 4/7 و 24/56 درصد از پروتئین خام بود (جدول 1). بیشترین بخش C مربوط به پروتئین خام کنجاله پنبه دانه و کمترین آن مربوط به پروتئین خام کنجاله سویا بود ($p < 0/05$). MirzaiiAlamoti *et al* (2005) مقدار بخش C پروتئین خام را برای کنجاله پنبه دانه 12/7 درصد و برای کنجاله سویا 5 درصد گزارش نمودند، در حالی که در مطالعه Ghoorchi & Arbabi (2010) برای کنجاله پنبه دانه 12/29 درصد و برای کنجاله سویا 4/11 درصد از پروتئین خام ارائه شده است. بخش C رابطه

گلیسینین به وسیله آنزیم های پروتئولیتیک میکروارگانیسم های شکمبه مربوط به باند دی سولفیدی آن است که سبب متصل شدن دو زیرواحد اسیدی و بازی می شود. پلی پپتید بازی گلیسینین نسبت به پلی پپتید اسیدی به تجزیه شدن مقاوم تر است. دلیل آن به آب گریزتر بودن پلی پپتید بازی نسبت به پلی پپتید اسیدی مربوط می شود. هرچه یک پلی پپتید آب گریزتر باشد، ساختار آن متراکم تر می شود و تجزیه شدن آن کاهش می یابد (Hu & Esen, 1981). از دلایل دیگر آهسته تر تجزیه شدن زیرواحد بازی، وجود اسیدهای انتهایی لیزین و آرژنین در قسمت N این پلی پپتید است. مشخص شده است که باکتری های پروتئولیتیک، به ویژه پریتولا رومینوکولا دارای فعالیت سیستمین پروتئاز، دی پپتیدیل پپتیداز و گلی تاملیل ترانسفراز می باشند و نمی توانند پپتیدهایی که در قسمت نیتروژن انتهایی، لیزین یا آرژنین دارند را تجزیه کنند. سایر آنزیم های پروتئولیتیک نیز چنین خصوصیتی را نشان می دهند (Wallace & McKain, 1991).

آلبومین و گلوبولین دو پروتئین عمده در کنجاله پنبه دانه می باشند. در پژوهش حاضر الگوی زیرواحدهای پروتئینی در کنجاله پنبه دانه نشان دهنده 4 زنجیره پلی پپتیدی بوده که مربوط به پروتئین های گلوبولین 9S با دو زیر واحد به وزن مولکولی 78/36 کیلودالتون و 71/10 کیلودالتون، گلوبولین 5S با یک زیر واحد به وزن مولکولی


مجموع دو پروتئین عمده کنجاله سویا، بتاکنگلیسینین (31 درصد) و گلیسینین (38/8 درصد) تقریباً 69/8 درصد کل پروتئین کنجاله سویا را شامل می شود که با نتایج Koshiyama (1983) همخوانی دارد. تفاوت های موجود بین وزن مولکولی زیرواحدهای کنجاله سویای مطالعه حاضر با سایر مطالعات احتمالاً به دلیل هتروژنیتی گیاه سویا و خصوصیت ذاتی پروتئین های عمده این گیاه و همچنین شرایط الکتروفورز نمونه ها، غلظت ژل و وزن مولکولی استاندارد (مارکر پروتئینی) می باشد (Hu & Esen, 1981). بر اساس مطالعات انجام گرفته، زیر واحد β پروتئین بتاکنگلیسینین به دلیل داشتن اسید آمینه لوسین در بخش N انتهایی خود دارای تجزیه پذیری کمتری نسبت به دو زیر واحد α و α' در شکمبه بوده و به این دلیل باکتری پریتولا رومینوکولا توانایی تجزیه زیر واحد β پروتئین بتاکنگلیسینین در حضور اسید آمینه لوسین را ندارد. زیرواحد اسیدی و بازی گلیسینین نسبت به زیرواحدهای پروتئین بتاکنگلیسینین آهسته تر تجزیه می شود و قسمت عمده پروتئین عبوری کنجاله سویا را تشکیل می دهد (Wallace & McKain, 1991).

بر اساس نتایج برخی مطالعات (Barton et al., 1975; Bradley et al., 1982)، باکتری پریتولا رومینوکولا، پروتئین های سویا با وزن مولکولی زیاد را نسبت به پروتئین های با وزن مولکولی کم سریعتر تجزیه می کند. آهسته تر تجزیه شدن

خضری و همکاران، 1390

کنجاله پنبه دانه در آب محلول است. تفاوت در میزان آب گریزی، شکل فضایی، ساختمان دوم و سوم، توالی و نوع اسیدهای آمینه علت متفاوت بودن تجزیه پذیری پروتئین های کنجاله پنبه دانه می باشد (Zarins & Cherry, 1981). به طور کلی، بر اساس نتایج پژوهش حاضر کنجاله بادام به عنوان یک محصول جانبی کشاورزی دارای ارزش تغذیه ای مناسب برای جایگزینی با کنجاله سویا در تغذیه دام و کاهش قیمت تولید محصولات پروتئینی در بخش دامپروری می باشد.

25/47 کیلودالتون و آلبومین 2S با یک زیر واحد به وزن مولکولی 15/84 کیلودالتون می باشد (شکل 1). نتایج این مطالعه با نتایج (REDAY-HELMY *et al.*, 1995) همخوانی دارد. دلیل وجود تفاوت بین وزن مولکولی زیر واحدهای کنجاله پنبه دانه در مطالعات مختلف، شرایط الکتروفورز نمونه ها، غلظت ژل و وزن مولکولی مارکر پروتئینی است (Ovchinnikova *et al.*, 1975; Dieckert *et al.*, 1981). بر اساس مطالعات انجام گرفته (Zarins & Cherry, 1981) زیر واحدهای 10 کیلودالتونی



شکل 1- الگوی زیرواحدهای مارکر پروتئینی، کنجاله های بادام، سویا و پنبه دانه با روش الکتروفورز SDS-Page.

Figure 1. The pattern of protein subunits of Ladder, almond, soybean and cottonseed meals with SDS- page electrophoresis.

منابع

- AOAC (2000). Official Methods of Analysis, 17th ed. Official Methods of Analysis of AOAC International, Gaithersburg, MD, USA.
- Arieli A (1998). Whole cottonseed in dairy cattle feeding: a review. *Animal Feed Science and Technology* 72:97-110.
- Barton KA, Thompson JF, Madison JT, Rosenthal R, Jarvis NP, Beachy RN (1982). The biosynthesis and processing of high molecular weight precursors of soybean glycinin subunits. *Journal of Biological Chemistry* 257: 6089-6095.
- Bradley RA, Atkinson D, Hauser HH, Oldani D, Green JP, Stubbs JM (1975). The structure, physical and chemical properties of the soybean protein glycinin. *Biochimica et Biophysica Acta* 412: 214-228.
- Chalupa W, Sinffen CJ (1996). Protein and amino acid nutrition of lactating dairy cattle - today and tomorrow. *Animal Feed Science and Technology*. 58: 65-75.
- Dieckert JW, Wallace RW, Dieckert MC (1981). Chemistry and biology of the cottonseed globulines. *Proceeding. Beltwide Cotton Production Research Conference*. p 351.
- Food and Agriculture Organization (FAO) (2009). <http://dad.fao.org/>accessed.
- Ghoorchi T, Arbabi S (2010). Study of protein Characteristic of five feeds by CNCPS model. *Asian journal of animal and veterinary advances* 5: 584-591.
- Hu B, Esen A (1981). Heterogeneity of soybean seed proteins: One-dimensional electrophoretic profiles of six different solubility fractions. *Journal of Agricultural Food Chemistry* 29: 497-501.
- Koshiyama I (1983). Storage proteins of soybean. In: Gottschak W, Muller HP (Eds.), *Seed Proteins: Biochemistry, Genetics, and Nutritive Value*. Junk W, The Hague, The Netherlands, p. 427-450.
- Krishnamoorthy UC, Muscato TV, Sniffen CJ, Van Soest PJ (1982). Nitrogen fractions in selected feedstuffs. *Journal of Dairy Science* 65: 217-225.
- Laemmli UK (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* 227: 680-685.
- Licitra G, Hernandez TM, Van Soest PJ (1996). Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. *Animal Feed Science and Technology* 57: 347-358.
- MirzaiiAlamoti HR, Amanloo H, Nikkhah A (2005). Protein and Carbohydrate Fractions of Common Feedstuffs in the Cornell Net Carbohydrate and Protein System. *Iranian Journal of Agricultural Science* 36: 409-414.
- Ovchinnikova NK, Kuchenkova MA, Yuldashev PKH (1975). An investigation of the globulins of cottonseeds. *Chemistry natural Compound* 10:413.
- Reday-Helmsy S, El-Shourbagy MN, Abo-Abasary AM (1995). Proteins of cottonseed. Extraction and Characterization by Electrophoresis. *Qatar universal Science Journal* 15:77-82.
- SAS Institute Inc. (2000). *SAS/STAT User's Guide: Version 8.1th edn*. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.

- Shannak S, SuÈdekum KH, Susenbeth A (2000). Estimating ruminal crude protein degradation with in situ and chemical fractionation procedures. *Animal Feed Science and Technology* 85: 195-214.
- Sniffen CJ, O'Connor D, Fox DG, Russell JB (1992). A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. *Journal of Animal Science* 70: 3562-3577.
- Stern MD, Bach A, Calsamiglia S (1997). Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. *Journal of Animal Science* 75: 2256-2276.
- Tamminga S, Van Straalen W, Subnel AJP, Meijer RGM, Steg A, Wever CJG, Blok MC (1994). The Dutch protein evaluation system: the DVE/OEB-system. *Livestock Production Science* 40: 139-155.
- Van Soest, P.J., Roberson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *J. Dairy Sci.* 74, 3583-3597.
- Wallace RJ, McKain N (1991). A survey of peptidase activity in rumen bacteria. *Journal of General Microbiology* 137:2259-2264.
- Zarins ZM, Cherry JP (1981). Storage proteins of gladness cottonseed flour. *Journal of Food Science* 46: 1855-1859.

Analysis the protein subunits and fractions of almond meal in comparison to soybean meal and cottonseed meal using SDS-Page electrophoresis and CNCPS method

Khezri A.^{*1}, Yoosofi-Ansari M.², Mohammad Abadi M.R.³

¹ Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

² MSc Student, Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

³ Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

Abstract

To study the protein subunits and fractions of almond meal in comparison to soybean meal and cottonseed meal, two methods including SDS-Page electrophoresis and CNCPS were used in this research. The results of protein fractions according to CNCPS shows a significant difference ($p < 0.05$) among non-protein nitrogen (A), rapidly degradable true protein (B1), moderately degradable true protein (B2), slowly degradable true protein (B3) and undegradable true protein (C) fractions of almond meal in comparison to soybean meal and cottonseed meal. In regards to SDS-Page electrophoresis results, amandin protein was mainly composed of two major polypeptides with estimated MWs in the range 63-100 kDa (acidic polypeptides) and 20-35 kDa (basic polypeptides). Furthermore, two major polypeptides including β -Conglycinin (three subunits, α , $\acute{\alpha}$, β with MWs of 91.83, 80.49 and 47.16 respectively) and glycinin (two acidic and basic subunits with MWs of 40 and 21.30 kDa respectively) were observed in soybean meal. The pattern of protein subunits in cottonseed meal shows four major polypeptides including Globulin 9S (with MWs of 78.36 and 71.10 kDa), Globulin 5S (with MW of 25.47 kDa) and Albumin 2S (with MW of 15.84 kDa). The results of the current study shows that almond meal have a good nutritive value and can be a good substitute for soybean meal in animal nutrition

Key words: *Almond meal, Protein subunits, SDS-Page electrophoresis, CNCPS.*

* Corresponding Author: Khezri A.

Tel: 03413202689

Email: akhezri@uk.ac.ir